

## ΑΥΧΕΝΙΚΗ ΛΕΜΦΑΔΕΝΟΠΑΘΕΙΑ

Η συχνότερη αυχενική μάζα στα παιδιά είναι ένας διογκωμένος λεμφαδένας. Οι περισσότεροι είναι μπροστά από τον στερνοκλειδομαστοειδή μυ. Η συχνότερη αιτία της διογκώσης είναι συνήθως λοίμωξη από ιούς. Η διογκώση παραμένει για μήνες. Οξεία πυώδης αδενίτιδα υπό την κάτω γνάθο συμβαίνει τα πρώτα χρόνια της ζωής (6 μηνών-3 ετών). Προηγείται μια φαρυγγίτιδα η λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού και αναπτύσσεται τοπικά οίδημα, ερύθημα και έντονη φλεγμονή. Η θεραπεία συνίσταται σε παροχέτευση του αποστήματος και αγωγή με αντιβιοτικά. Σε περίπτωση χρόνιας φλεγμονής (δηλ. παραμονή του αδένου περισσότερο από 3 εβδομάδες), ο αδένος ελέγχεται κινητός, χωρίς ευαισθησία και σχετικά μαλακός. Γενικά δεν χρειάζεται αφαίρεση και βιοψία, παρά μόνον όταν υπάρχει μάζα λεμφαδένων μεγαλύτερη από 2 cm με αυξητικές τάσεις.

Άλλα σπανιότερα αίτια είναι η αδενίτιδα από άτυπα μυκοβακτηρίδια, η αδενίτιδα από γρατσούνισμα από νύχια γάτας και η νόσος του Hodgkin. Στην πρώτη και Τρίτη περίπτωση, η διάγνωση τίθεται από τη βιοψία.