

ΒΡΑΓΧΙΑΚΑ ΣΥΡΙΓΓΙΑ ΚΑΙ ΒΡΑΓΧΙΑΚΕΣ ΚΥΣΤΕΙΣ

Τα βραγχιακά συρίγγια και οι βραγχιακές κύστεις προέρχονται από εμβρυικές δομές, οι οποίες εμφανίζονται κατά την εμβρυογένεση της κεφαλής και του τραχήλου.

Τα συρίγγια εκδηλώνονται ως μικρό δερματικό άνοιγμα κατά μήκος του πρόσθιου κατώτερου τριτημρίου του στερνοκλειδομαστοειδούς μύος, από το οποίο εξέρχεται σάλιο ή βλενώδεις εκκρίσεις. Η θεραπεία συνίσταται στη χειρουργική εκτομή ολόκληρου του συριγγίου, το οποίο μπορεί να φτάνει μέχρι τον κάτω πόλο της φαρυγγικής αμυγδαλής, περνώντας μεταξύ έσω και έξω κρωτίδας.

Οι βραγχιακές κύστεις εμφανίζονται στο πλάγιο τοίχωμα του λαιμού και με μέγεθος φουντουκιού μέχρι καρυδιού. Έχουν τάση για φλεγμονές και συχνά συνυπάρχουν με συρίγγια. Πρέπει να αφαιρούνται το συντομότερο μετά την διάγνωση.



Συρίγγιο τραχήλου μετά την αφαίρεσή του.