

## ΚΥΣΤΗ ΘΥΡΕΟΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ

Η κύστη του θυρεογλωσσικού πόρου είναι η πιο συχνή συγγενής μάζα της μέσης γραμμής του τραχήλου, που εμφανίζεται πριν τη δεύτερη δεκαετία της ζωής. Συνήθως, περί την ηλικία των τεσσάρων ετών, εμφανίζεται ξαφνικά μια μάζα στο λαιμό, η οποία μετακινείται με την έξοδο της γλώσσας από το στόμα και τις κινήσεις κατάποσης. Η πάθηση εμφανίζεται συχνότερα σε αγόρια. Η κύστη προέρχεται από εμβρυολογικά υπολείμματα. Προκαλεί τοπική ενόχληση, μπορεί να εμφανίσει φλεγμονή και σπάνια να εξαλλαγεί (εμφάνιση κακοήθειας).

Η διάγνωση μπαίνει με την κλινική εξέταση. Το υπερηχογράφημα δείχνει μια κύστη 0,4-4 cm διάμετρο. Αν η κύστη μολυνθεί και παρουσιάσει φλεγμονή, τότε η αφαίρεσή της είναι πιο δύσκολη και οι πιθανότητες υποτροπής περισσότερες, γι' αυτό πρέπει να αφαιρείται αμέσως μετά την διάγνωση. Στη χειρουργική επέμβαση, εκτός από την κύστη, πρέπει να αφαιρείται και το κεντρικό τμήμα του υοειδούς οστού.



Φλεγμαίνουσα κύστη θυρεογλωσσικού πόρου.