

ΚΟΚΚΙΩΜΑ ΟΜΦΑΛΟΥ

Η έξοδος εκκρίματος από τον ομφαλό κατά την νεογνική περίοδο προκαλεί έντονη ανησυχία τόσο στους γονείς, όσο και στους ιατρούς.

Η συχνότερη αιτία είναι το κοκκίωμα του ομφαλού, μια κοινή φλεγμονώδης αντίδραση στο απορροφούμενο υπόλειμμα του ομφάλιου λώρου, η οποία θα πρέπει να υποχωρήσει την 2η ή 3η εβδομάδα της ζωής με εφαρμογή αντισηπτικών. Αν επιμένει μετά την περίοδο αυτή, θα χρειαστεί κάποια θεραπεία, συνήθως καυτηρίαση με νιτρικό άργυρο.

Αν ακόμη και μετά από αυτό επιμένει το έκκριμα ή περιέχει ούρα ή κόπρανα, τότε υπάρχει ή ανοικτός ουραχός (επικοινωνία ουροδόχου κύστης με ομφαλό) ή ανοικτός ομφαλομεσεντερικός πόρος (επικοινωνία εντέρου με ομφαλό) και πρέπει οπωσδήποτε να γίνει έλεγχος με υπερηχογράφημα, για ύπαρξη κύστης ή μάζας και επί αρνητικών ευρημάτων λαπαροσκόπηση.

Το ευμέγεθες κοκκίωμα του ομφαλού που δεν υποχωρεί με καυτηρίαση, αφαιρείται χειρουργικά.